"减肥神药"管用吗?

2024年公众十大用药提示发布 维生素D能不能随便补

2024年"全国药品安全宣传周"9月2日启动, 主题为"药品安全 良法护航"。各地开展药品、医 疗器械、化妆品检验公众开放日活动,普及药品安 全、药物警戒、防范药物滥用等知识,提升公众安全

> 国家药监局日前针对老年人、慢性病患者等重 点人群,发布了《公众十大用药提示》,提醒大家规 避用药误区。

用药认知水平,携手共建药品安全防线。

提示一: 慢病不能只囤药, 定期复诊莫迟疑

提示二:控制血压要坚持,随意停药伤身体

提示三: 颈动脉斑块高发, 严加防控别大意

提示四: 正确认识肥胖症, 盲信神药不托底

提示五: 老年肝肾功能减, 谨慎用药方受益

提示六: 奥司他韦抗流感,儿童用药须仔细

提示七: VD需要科学补,缺乏过量皆不宜

提示八: 人未老而头先秃, 长期用药救发际

提示九: 服药之前看剂型, 随意掰开要摒弃

提示十: 光敏药物避阳光, 注意事项切牢记



控制血压要坚持 随意停药伤身体

慢病不能只囤药 定期复诊莫迟疑

有些慢病患者认为用药以后感觉不错,

一直吃药就可以了,为了方便就只囤药吃

药,而不按照要求定期复诊做检查。其实正

诊治,防止重度并发症造成致残致死。

监测,接受教育和随访,千万不要嫌麻烦。

易延误病情

确的做法是,即便有些慢病治疗药物可以开较

长时间的处方,也要观察病情变化。如果患者长

期自行用药不复诊,不能及时调整治疗方案,往往容

以2型糖尿病治疗为例,控制血糖稳定的主要目的

之一是预防和延缓并发症。随着病程的延长,如果出现了

轻、中度并发症,需要控制血糖、血压、血脂等危险因素,针

对发病机制进行治疗;如果出现了重度并发症,则需要到

眼、肾、神经、心脏、血管外科等专业科室就诊,接受针对性

所以,慢病患者不应只囤药吃药,还要定期复诊进行

高血压是最常见的慢性病之一。有些高血压患者,用 药依从性不好,或擅自长期停药,或断断续续用药,却不知 这样会对健康产生严重危害。

高血压是罹患卒中、心肌梗死乃至造成心血管死亡的 首要危险因素。高血压患者只有坚持长期服药,将血压控 制在正常范围内,才可显著降低心肌梗死、脑梗死、心力衰 竭和心房颤动等心脑血管并发症的发生率,降低心脑血管 疾病相关死亡率和全因死亡率。因此,不符合停药条件的 高血压患者,一定要打消停药的想法,坚持服药

如经医生判断确实可以减药,减量原则为缓慢平稳减 量,以避免血压波动或反弹。如果是联合用药,应优先进 行减量,而非先减掉其中1种药物。如血压保持正常在6 个月以上,可先将原有药物剂量减成最低维持剂量。

需要注意的是:基础为Ⅱ级以上、中高危组的高血压 患者,完全停药的可能性不大,建议在心血管病专科医生 的指导下调整降压药物进行治疗。

# 颈动脉斑块高发 严加防控别大意

颈动脉是人体的主要动脉之一。颈动脉斑块是指动 脉内层的胆固醇、钙盐、纤维蛋白等物质在血管壁逐渐沉 积形成的一种病变。当颈动脉出现斑块时,就如同血管被 石子堵住了道路,斑块一旦脱落,随血液循环进入脑血管, 堵塞远端相对比较细小的血管,则会导致卒中。

首先,改善生活方式。控制饮食、改善饮食结构、增加 运动、减轻体重、戒烟限酒,这些措施有助于降低血液中胆 固醇水平,防止斑块进一步增长或增多。

第二,高血压和糖尿病都是导致动脉粥样硬化斑块形 成的重要因素。若患有高血压或糖尿病,要积极合理地控 制血压、血糖、

第三,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)达标是实现斑 块逆转的关键。现有研究表明,LDL-C控制在2.0毫摩 尔/升(mmol/L)以下,多数斑块将不再继续增长;LDL-C 控制在1.5mmol/L,大多数富含脂质的动脉斑块将可以

他汀类药物是治疗颈动脉斑块的基石。需要强调的 是,多数患者应长期乃至终身服用他汀类药物,这是抑制 斑块增长的有效措施,间断用药的做法非常不可取。

# 正确认识肥胖症 盲信神药不托底

肥胖是指体内脂肪细胞总含量增多或者局部含量增 多及分布异常的一种慢性代谢性疾病。身体质量指数(简 称BMI),是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是

否健康的一个标准。BMI=体重(千克,kg)除以身高(米, m)的平方,BMI≤18.5kg/m²为体重过低,18.6kg/m²-23.9kg/m²为正常体重,24.0kg/m²—27.9kg/m²为超重, BMI≥28.0kg/m²为肥胖。

我国有肥胖症的诊疗规范。减重时,要在专科医生的 指导下进行干预,用营养+运动+心理等综合生活方式科 学减重。确需使用药物减重时应遵循医嘱,仔细权衡用药 适应证、禁忌证、药物的不良反应等因素。滥用减肥药物 存在安全风险。目前还没有所谓既没有副作用,又不会反 弹的"减肥神药",肥胖症患者切勿盲目跟风自行用药,以 免适得其反,伤了身体。

### 老年肝肾功能减 谨慎用药方受益

老年人用药可遵循以下原则-

选择合理化:选择疗效确定、能缓解症状、纠正病理过 程或消除病因的药物,并遵循"最少数量药物、最小有效剂 量"的原则。一般不推荐4种以上药物配伍使用,以减少 药物不良反应发生。尽量选择有"一箭双雕"效果的药物, 避免同时服用具有相同作用或相同副作用的药物。

剂量个体化:老年人用药应从较小剂量开始,逐渐增 加到最佳疗效的治疗剂量。《中国药典》中明确规定:60岁 以上老年人应使用成人剂量的3/4,一般也根据年龄、体 重、体质等情况,以成人用量的1/5、1/4、1/2、2/3、3/4顺 序用药。不可一味增加剂量,以防药物蓄积引起严重不良 后果。同时,要注意加强治疗药物监测,必要时监测血药

提高依从性:70岁以上的老人,常常记忆力下降,或 多病共患,需要使用的药物种类繁多且复杂,对医生、药师 交代的服药方法易遗忘或混淆,从而导致用药错误(忘服、 误服甚至过量)。对此,可将用药方案的复杂性降低到最 低程度,以提高老年患者的依从性。

#### 奥司他韦抗流感 儿童用药须仔细

儿童是用药的特殊人群,使用奥司他韦防治流感时, 通常会选择颗粒剂,方便服用。要特别注意以下事项-

用药时机:作为治疗用药,奥司他韦应在流感症状出 现后的48小时内开始服用,越早使用效果越佳;如果治疗 有效,通常在48小时内即可退热。而作为预防用药,奥司 他韦应在与流感患者密切接触后的2日内开始服用。

用药剂量:儿童的使用剂量应根据体重来计算(可参

昭说明书),并目家长应确保按昭医嘱准确给药。

用药疗程:一般建议连续服用5天,即便儿童在服药 期间有所好转,也应坚持完成整个疗程。

不良反应: 奥司他韦最常见的不良反应包括恶心、呕 吐和腹痛等,亦可能出现皮疹、精神状况改变等症状。儿 童必须在成人监护下用药,如出现疑似不良反应,应由专 业医务人员权衡利弊并决定是否停药。

#### VD需要科学补 缺乏过量皆不宜

维生素D对人体健康有广泛作用,特别对肌肉骨骼健 康至关重要。它能促进肠道钙吸收,使新形成的骨样组织 矿化,并在肌肉功能中起重要作用。

成人维生素D缺乏症可导致骨质疏松症,进而引发跌 倒和骨折。治疗可首选维生素 D3; 不能应用维生素 D3 时,也可应用维生素D2。推荐优先口服给药,其次才考虑 胃肠外途径给药。给药剂量应个体化,由医师制定负荷剂 量和维持剂量的治疗方案,且依据临床反应作调整。

维生素D并非多多益善,短期内摄入大剂量或长期服 用超剂量维生素D,可导致严重中毒反应,引起高钙血症, 使全身性血管钙化、肾钙质沉淀及其他软组织钙化。高钙 危象病情凶险,患者可能因肾脏功能衰竭或者心跳骤停而 导致死亡。

对于正常人而言,多做户外运动、多晒太阳有利于促 讲合成维生素D. 无需额外补充。

# 人未老而头先秃 长期用药救发际

当毛囊因为衰老、营养失衡、疾病等原因失去正常功 能时,就可能会出现脱发。

非那雄胺是口服处方药,效果较强。睾酮在5α-还原 酶的作用下才能转变成DHT,非那雄胺作为5α-还原酶的 特异性抑制剂则可以阻断这一环节,从而减少体内的DHT, 显著改善毛囊萎缩。建议严格遵照医嘱,按时、按量、按疗程 用药。如果出现严重不适症状,应及时就医治疗。

米诺地尔是一种周围血管舒张药。其局部外用能扩 张血管,增加头皮的营养供血,延长毛囊的生长周期,从而 促进头发生长。米诺地尔外用制剂属于非处方药,获得方 便,但其效果相对较弱,主要用来预防脱发。

严格地讲,脱发是没有办法根治的,需要长期用药来 维持。在使用药物治疗的同时,还要养成良好的生活习惯 和饮食习惯,才能更有效地减少脱发。

## 服药之前看剂型 随意掰开要摒弃

很多人在服药的时候,觉得药片大,不易吞服,于是就 想办法将药片掰开或者磨碎服。殊不知,有些药物为特殊 剂型,并不能盲目掰开后服用。

哪些药物不建议掰开服用呢?

- 1. 缓控释剂: 若掰开服用, 会破坏药物的缓控释结构, 使药物在短时间内大量释出,导致药物过量,甚至引起毒
- 2.肠溶片: 若掰开服用, 会破坏其表面的包衣层, 使 得药物在胃中就会被分解,失去应有的疗效,也失去了肠 溶包衣对胃黏膜的保护作用,可能刺激胃黏膜,引起不适。
- 3.包衣片: 若掰开服用, 会在影响药物口感的同时增 加药物对口腔、胃黏膜等的刺激性,影响药物疗效,增加不 良反应等
- 4. 胶囊剂: 若盲目地将胶囊壳打开直接服用其中的 药物,就失去了胶囊的作用。

## 光敏药物避阳光 注意事项切牢记

人体适当晒太阳可以促进机体合成维生素D,促进钙 的吸收。但有些药物服用后,在阳光或紫外线刺激下,可 引起人体过敏,这类药物叫光敏性药物。

药物光敏反应分为光毒性反应和光变态性反应。

预防药物光敏反应要做到:用药前,过敏体质、有光敏 反应史的患者应主动告知医生,方便医生选择合适的药 物。若正在使用光敏性药物,用药期间及停药后5天内, 应采取适当的防护措施,如使用防晒霜、穿戴可遮光的衣 物等以避免日光暴晒,或采取晚间服药等方式。

如使用药物后出现皮疹等光敏反应,应立即停药,及 时到医院就诊,在医生指导下进行相应治疗。

据新华社、央视、中新社报道

本报地址: 武汉市江岸区金桥大道113号 新 闻 热 线 电 话:82333333 发行服务热线:85888888 广告热线: 82410962 每份零售价:1.00元