

23年前注射奥美定埋隐患

女子乳房变形剧痛，医生紧急手术解除危机

武汉晚报讯(记者刘璇 通讯员黄婷)53岁的方女士怎么也没想到,23年前注射进胸部的“美容材料”,会在近日突然“引爆”健康危机。她的双乳房在短短两个月内迅速增大,伴随持续胀痛,让她备受煎熬。武汉大学中南医院整形美容科专家紧急出手,通过微创手术为她清除了体内已发生病变的注射材料。日前,方女士顺利出院,终于卸下了心头大石。

23年前,方女士跟风接受了当时流行的奥美定(聚丙烯酰胺水凝胶)注射隆乳手术。尽管此后多年,她的胸部外形基本维持,但其间断断续续出现过不适感,只是这些轻微不适始终未引起她的足够重视。出于对手术的恐惧,方女士多年来始终没有进行过系统性检查和针对性治疗。

平静的状态在近期被彻底打

破,方女士的胸部在两个月内突然出现快速增大的症状,不仅如此,还伴有明显的坠胀感和疼痛感,乳房逐渐变得“像石头一样硬”,让她陷入了深深的恐惧与不安之中。

接诊的武汉大学中南医院整形美容科主任郭亮详细检查后,迅速做出判断:她的情况多半是奥美定在体内长期存留引发的急性炎症反应,必须尽快进行手术干预。“注射进入体内的奥美定,长期存留后可能发生变性,并且会在体内形成厚重的包膜,这不仅会导致乳房疼痛、外形变形,还会干扰乳腺相关检查,掩盖乳腺早期病变,存在不可忽视的健康隐患。”郭亮进一步解释。

郭亮介绍,奥美定自2006年起就已被国家明文禁止使用,但它的危害可能在潜伏多年后突然显现。它在体内可能引发急性炎



郭亮主任团队为方女士清除体内的奥美定。

症,导致组织红肿、剧痛;长期存留则会移位、形成硬结,并降解产生有毒物质,增加组织恶变风险。此外,它还会干扰乳腺超声、钼靶等检查,影响乳腺癌早期发现。

针对此类情况,郭亮提醒市

民,若曾注射不明材料,一旦出现红肿、疼痛、变形等异常,须立即就医;即使暂无症状,也应定期做影像评估。他呼吁,追求美丽,务必选择正规医院、正规医生和正规产品,切勿触碰来历不明的注射物。

3岁娃“荡秋千”后手臂突然不能动?

医生提醒:寒假当心幼儿“牵拉肘”

武汉晚报讯(记者赵萌萌 通讯员张素华 陈舒)“就是荡了一下,也没摔着碰着,胳膊怎么就不能动了呢?”近日,在武汉市第三医院首义院区急诊科,乐乐爸爸一脸焦急。原来,父子俩在公园玩耍时,爸爸牵着3岁乐乐的手轻轻荡秋千,孩子突然大哭起来,左手臂随即软软垂下,怎么也抬不起来。

接诊的急诊科金屹恒医生仔细检查后,双手托住乐乐的胳膊,轻柔地旋转了几下。不到一分

钟,孩子止住了哭声,试探着动了动手臂,很快便恢复了活力,抓起一旁的玩具。“这是典型的桡骨小头半脱位,也就是常说的‘牵拉肘’。”金屹恒向家长解释道,寒假期间孩子外出活动多,这类情况在急诊科并不少见。

金屹恒介绍,桡骨小头半脱位是1至4岁幼儿最常见的肘部损伤之一。由于幼儿肘部桡骨环状韧带尚未发育牢固,较为松弛,当手臂受到纵向牵拉,比如突然被拎起、穿衣时用力过猛或跌倒瞬间被

猛地拉住手腕,韧带容易滑入关节间隙,导致桡骨小头卡住,孩子会因疼痛而拒绝活动手臂。

“门诊中,八成以上都是家长牵拉不当造成的。”金屹恒表示,常见情形包括孩子快摔倒时被突然拽住、玩“拔萝卜”、转圈游戏、穿脱紧身衣服时生拉硬拽等。他提醒,发生这种情况后,孩子手臂通常保持略微弯曲、掌心向内的姿势,不肯拿东西、怕人碰,但肘部外观一般没有明显肿胀,这与骨折不同。

一旦怀疑孩子发生“牵拉

肘”,家长该如何应对?金屹恒表示,最关键的是保持冷静,不要尝试自行复位或反复屈伸孩子的胳膊,以免造成二次损伤。可以用围巾、三角巾等将患肢临时悬吊在胸前,并立即前往医院。专业复位操作快,孩子痛苦小,预后也好。但必须由医生来完成,以排除其他可能损伤。

预防远比治疗更重要。金屹恒建议,日常照顾幼儿时,应避免单手牵拉孩子手腕或前臂。牵手最好握住其上臂或腋下;穿脱衣物时动作需轻柔;同时避免那些牵拉手臂的互动游戏。随着孩子年龄增长,韧带和骨骼逐渐发育成熟,5岁后此类损伤的发生率便会大幅降低。

花季少女口角歪斜疑似“中风”

真相是受凉引发面瘫

口角歪斜、眼睑闭合不全、抬头纹消失——日前,17岁高中生小丽(化名)清晨照镜子时,被自己的模样吓了一跳。担心是“中风”,家长送其就医后才知是急性左侧面神经炎。医生提醒,近期早晚气温较低,需警惕此类疾病高发。

1月26日下午自习后,小丽顶着寒风骑车回家,面部未做任

何防护。次日清晨,小丽刷牙时发现左侧嘴角歪斜,吃饭时,食物总残留于左侧脸颊部与牙齿间,镜中更是看到自己左侧抬头纹消失,左眼无法完全闭合,口角向右侧偏斜。担心是“中风”,家长赶紧陪同她前往武汉脑科医院·长江航运总医院神经内科就诊。经细致查体及病史分析,神经

内科二病区接诊专家龚丹群副主任医师明确小丽患上急性左侧面神经炎。

龚丹群立即组织管床医师李静静为小丽制定了抗病毒、营养神经联合康复理疗等个体化诊疗方案。经近一周系统干预,小丽左侧额纹部分恢复,左眼眼睑闭合功能基本恢复正常,口角偏斜

症状明显改善,鼓腮、吹口哨时无漏气情况,可正常进食与学习。

龚丹群介绍,面神经炎与中风症状相似但病因不同,前者在年轻人中高发,多由受凉、疲劳、病毒感染诱发,发病72小时内为诊治黄金期;后者常伴随肢体麻木、言语不清、头晕等症状,额纹多正常,头颅CT/MRI可明确鉴别。

她提醒,预防面瘫,日常需做好面部保暖,避免熬夜疲劳,适当运动增强免疫力,多吃富含维生素B族的食物。

通讯员周珊