

一批孩子身上惊现“内裤烙印” 竟是消毒过猛导致接触性皮炎

武汉晚报讯(记者王春岚 通讯员张景祎)孩子腹部、臀部的隐私部位红肿、脱皮,犹如被内裤烫到。细心的医生反复询问,终于找出幕后原因:消毒制剂残留引发接触性皮炎。10月19日,武汉儿童医院皮肤科公布一批类似案例并提醒家长,给孩子清洗内衣裤时,尽量选择残留少的天然制剂洗涤,多漂洗几遍。

卢静静是武汉儿童医院皮肤科副主任医师。今年夏天,她突然发现一个怪象:接连接诊了一批腹部、臀部皮肤受损的孩子,他们的损伤部位集中在与内裤接触的部位。

最先引起关注的是3岁男孩小宇(化名),发病初期只是肚脐下方、腹股沟三角区域皮肤泛红,后来逐渐扩散,家长擦药膏也不见效。来武汉儿童医院看病时,孩子隐私部位留下犹如灼烧一般的痕迹。

此后,卢静静和同事收治了约10名类似患儿,都是隐私部位红肿、脱皮、一碰就疼,痕迹像化学灼烧,且大

多是内裤覆盖的区域。

刚开始,卢静静和同事考虑是因为夏天太热、出汗太多,捂在皮肤上导致皮肤受损。但有些孩子的腹部、大腿也出现了类似情况。医生们根据症状判断为接触性皮炎,经过对应治疗后,孩子身上用药区域的红肿出现改善,但仍不断有新的区域出现症状。

难道是内裤材质出了问题?但家长反映,孩子们穿的大多是旧内裤,经过反复洗涤,而烧灼痕迹是近期才出现的。卢静静反复询问,终于又发现了一个细节:大部分患儿家长都很注意孩子的卫生情况,平时内衣裤单独洗涤。今年夏秋阴雨天气较多,比较潮湿,家长担心细菌滋生,多加了消毒工序,用消毒制剂浸泡内衣裤,有的每天都泡、有的隔天泡一次。

原因找到了。“消毒制剂浓度太高,或者漂洗不够彻底,大量化学制剂残留在内裤上。一旦遇到高温天气,孩子出汗较多,汗渍浸润内裤后,化学残留被析出,就容易引发接触性



卢静静接诊患儿,查看孩子皮肤情况(资料图)。

通讯员张祖国 摄

皮炎。”卢静静告诉家长。

在她的指导下,有的家长省去了消毒环节,有的家长消毒后增加漂洗次数,减少化学制剂残留,孩子们身上的灼烧痕迹逐渐减轻。

孩子的贴身衣物到底该怎样清

洗?该科主任医师付桂莉建议家长,给孩子单独清洗内衣裤时,优先选择手洗,尽量选择残留少的天然制剂洗涤,多漂洗几遍,最大程度降低化学残留带来的风险;洗后优先选择阳光暴晒或高温烘干。

女子丰臀后臀部凹凸不平 医生:警惕脂肪填充远期并发症

武汉晚报讯(记者刘璇 通讯员黄婷)本想通过自体脂肪丰臀塑造理想臀形,不料术后5个月臀部凹凸不平、触感怪异,坐下时还有明显晃动感。近日,饱受困扰的罗女士(化姓)来到武汉大学中南医院整形美容科求助,检查确诊脂肪填充后组织病变,接受修复手术后顺利出院。

几个月前,39岁的罗女士在一家机构接受了自体脂肪丰臀手术。术后2个月,她就发现臀部局部不平整。随着时间推移,患处触感持续异常,坐下时臀部出现明显晃动,局部异常柔软,这让她十分焦虑,迫切想找到问题根源和解决方案。多方打听,她来到武汉大学中南医院整形美容科。

郭亮主任分析,这类表现高度怀疑脂肪吸收不均、脂肪坏死或液化、局部积液等问题,需要与其他术后并发症仔细鉴别。他介绍,自体脂肪填充,是抽取自身脂肪提纯处理后移植到目标部位,最终效果取决于脂肪存活率、移植区域血供、组织条件和术后护理等多重因素。移植的脂肪细胞如果无法建立充足血供,就难以存活,继而发生吸收、坏死,严重时液化,形成结节和囊性改变,造成外形



郭亮(左一)带领团队为罗女士做修复手术。

凹凸不平。

此外,术中脂肪注射层次、分布不均、术后局部组织产生异常反应,同样会改变外观与触感。“术后出现凹凸、触感异常,往往不是单一原因造成,不能凭主观感受简单归因。”郭亮团队针对罗女士的情况评估认为,臀部脂肪填充后局部凸起已经明显影响外观和生活质量,具备手术修复指征,决定为她实施臀部吸脂修复术。

手术由郭亮主刀,术中吸出约150毫升的黄色油性液体,可以看到脂肪已经液化、坏死。10月22日,经

过3天的精心护理治疗,罗女士达到出院标准,顺利出院。

郭亮提醒求美者,脂肪填充术后出现形态异常,医生会结合术后时长、症状变化、查体和影像学检查结果,综合鉴别脂肪液化、积液、脂肪坏死、感染等问题,再制定修复方案。一旦出现局部红肿、疼痛加剧、皮温升高、发烧,或是肿胀短期内快速加重,一定要第一时间就医排查感染。如果出现形态、触感异常,千万不要自行按揉、挤压患处,更不要盲目接受二次填充,否则会加重组织损伤。

异物入眼随手一揉 三个月后女子眼内 长出“肉芽肿”

一粒肉眼几乎看不见的异物进入眼睛,随手揉了揉,三个月后竟“长”成了需要手术的肿物。近日,50多岁的武汉农妇万女士(化姓)在武汉大学附属爱尔眼科医院接受了眼睛结膜肿物切除手术,终于摆脱了长期眼疾困扰。

今年夏天抢收小麦时,万女士突然感觉有东西进了眼睛,但农活正紧,她随手揉了揉便继续忙活。随后眼睛开始不对劲:异物感、发红、发痒症状反复出现,滴眼药水也不见好转。硬扛三个月,症状不减反重,她这才来到武汉大学附属爱尔眼科医院就诊。

该院眼表及角膜病专科医师王娟检查发现,患者眼里有一个3×8毫米的肿物,“裂隙灯下都看不清它的根部”。结合病史,王娟判断这是长期异物刺激引发的肉芽组织增生,最终确诊为结膜肿物,需手术切除。

王娟分析,进入眼内的是肉眼很难发现的微小异物,反复眨眼、揉眼不断摩擦刺激结膜组织,长期慢性刺激最终催生肉芽增生。

她提醒,下地劳作时简单防护就能降低风险:佩戴护目镜、墨镜,或戴宽檐帽子遮挡,都可阻挡粉尘、毛刺飞溅入眼。一旦异物进眼,千万不要用手揉搓。

通讯员彭祎